



Kit Piégeage à phéromone du Papillon de la chenille Bombyx Disparate



La Bombyx disparate (*Lymantria dispar*) est une chenille phytophage de l'ordre des Lépidoptères. Le papillon mâle est brun avec des antennes plumeuses alors que la femelle a des ailes striées et ne volent pas. Durant l'été, la femelle pond ses œufs sur le tronc des arbres. Les œufs n'écloront qu'au printemps suivant (fin mars). Les chenilles issues des œufs sont velues et non urticantes. Elles vont se nourrir principalement de feuilles de chêne. On peut les retrouver sur d'autres espèces comme le bouleau, mélèze, pin, pommier, orme, ... Elles vont ensuite se transformer en chrysalide. Les papillons émergeront 2 semaines plus tard. Il y a une seule génération par an et le vol se fait de **mi-juillet à mi-août**.

Le kit de piégeage permet d'attirer les papillons mâles de la chenille Bombyx Disparate, à l'aide d'une phéromone sexuelle, afin de stopper la fécondation des papillons femelles donc la reproduction de l'insecte. Cela permet de réduire considérablement le nombre de papillons les années suivantes.

La phéromone fournie est composée de micro-capsules permettant une diffusion régulière et rallongée sur toute la saison pour une meilleure efficacité.

Phéromone 100% biodégradable et sans danger pour l'environnement
Stockage simplifiée à température ambiante
Longue durée de conservation : 3 ans

ATTENTION

**CONSERVER VOTRE PHÉROMONE A TEMPÉRATURE AMBIANTE,
PAS DE CONGÉLATION**

Mise en place du kit piégeage



Dosage :

- Pour un arbre isolé, prévoir un piège/ arbre,
- sinon il est conseillé de placer 2 pièges/ Ha

Mise en place :

- Remplir le piège de 0.5 l d'eau et deux gouttes d'huile non odorante (colza ...), ou 2 gouttes de liquide vaisselle non odorant ou 2 gouttes de savon noir non odorant pour empêcher l'eau de s'évaporer et de faciliter la noyade des papillons.
- Placer le panier à phéromone sur le couvercle vert et vider le contenu de la seringue dans le fond du panier à phéromone vert puis refermer le panier à phéromone avec son opercule de fermeture.
- Accrocher le piège au tronc de l'arbre, le plus haut possible.

Le piège doit être dégagé pour que les papillons puissent tourner autour.

Les papillons attirés par la phéromone sexuelle femelle pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau savonneuse.

L'eau contenu dans la phéromone va s'évaporer et il ne restera que la substance phéromonale ressemblant à une fine pellicule de verni. On pourrait avoir l'impression que la phéromone a disparu.

Vérifiez visuellement s'il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone.

Début septembre, enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez mettre une nouvelle dose de phéromone.

Une dose de phéromone permet 3 mois de protection

Période de mise en place du kit piégeage

Mise en place de début Juillet à début Septembre



